



PROCESSIONÀRIA DEL PI : UN PERILL PEL TEU GOS

La processionària del pi (*Thaumetopoea pityocampa*) és una eruga d'uns 30 a 45 mm, altament perillosa per als gossos.

Es tracta d'un insecte lepidòpter (papallona nocturna). A la fase larvària és una eruga molt urticant.

Després d'alimentar-se dels pins, les erugues s'enterren a terra a la primavera per convertir-se en crisàlides i, posteriorment, en papallones.

On les trobem?

Es troba principalment als boscos de pins i cedres a la regió mediterrània. El període de major risc és a la primavera. Es caracteritzen per formar "processions" (files índies) en baixar de l'arbre i per formar bosses blanquinoses a les copes dels pins.

Es una plaga forestal que debilita el pi i el fa més susceptible a altres plagues.

Per què és perillosa la processionària?

Les larves a partir del tercer estadi tenen en el dors uns sacs amb pèls urticants que contenen una toxina anomenada *thaumatopina*, causant reaccions al·lèrgiques, dermatitis i irritació en vies respiratòries en persones i animals.

Els gossos, per la seva naturalesa curiosa, solen ensumar, llepar o fins i tot mossegar aquestes erugues, fet que provoca una reacció immediata i potencialment greu. També poden veure's afectats si els pèls de la processionària es dispersen a l'aire i entren en contacte amb la pell, els ulls o les mucoses.

Síntomes de contacte amb la processionària:

Si un gos entra en contacte amb una processionària, els símptomes poden aparèixer en qüestió de minuts. Els més comuns són:

- Hipersalivació intensa
- Inflamació de la llengua i llavis (poden augmentar de mida ràpidament)



- Dificultat per respirar (en casos greus)
- Dolor intens i agitació
- Necrosi de la llengua (pot arribar a perdre part del teixit)
- Vòmits i dificultat per empassar
- Si els ulls entren en contacte amb els pèls urticants, el gos pot presentar conjuntivitis severa i fins i tot úlceres corneals.

Què fer si el teu gos entra en contacte amb la processonària?

Davant el mínim contacte amb una processonària, actua ràpid per evitar complicacions:

- Evita que es llepi o es fregui la zona afectada. El contacte pot estendre's i agreujar la reacció.
- Renta la zona amb abundant aigua tèbia. No freguis, només deixa que l'aigua arrossegui els pèls urticants. No utilitzis aigua freda, ja que pot afavorir l'absorció de la toxina.
- Si hi ha contacte a la boca, neteja la zona amb aigua acuradament. Fes servir una xeringa sense agulla per esbandir la boca, però sense forçar.
- Acudeix immediatament al veterinari. És fonamental per evitar complicacions com la necrosi de la llengua o una reacció anafilàctica greu.

Prevenció: la millor estratègia

Per protegir el teu gos de la processonària:

- Evita passejar per zones de pins en èpoques de risc.
- Mantén el gos amb corretja i vigilant.
- Presta atenció a la presència de nius als arbres.
- Consulta amb un veterinari sobre tractaments d'emergència en cas d'exposició accidental.

En conclusió, la processonària del pi és un enemic silenciós però altament perillós per als nostres gossos. La seva presència s'ha avançat en el temps a causa dels canvis en la temperatura, augmentant el risc en èpoques més primerenques de l'any. Amb prevenció i una actuació ràpida, podem evitar conseqüències greus.

