




FOCO DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VALENCIA (9 de marzo de 2026)

Las autoridades veterinarias de la Comunidad Valenciana han notificado un foco de enfermedad de Newcastle en una granja de gallinas ponedoras localizada en el municipio de Terrateig, en la comarca de Vall D'Albaida (provincia de Valencia). Ver mapa 1.



Mapa 1: Localización del foco de enfermedad de Newcastle en aves de corral en Terrateig

La granja está situada en el radio de 10 km de los focos detectados con anterioridad el pasado mes de diciembre y de los que ya se habían levantado todas las medidas en el mes de febrero. Se trata del sexto foco de enfermedad de Newcastle detectado en España en la presente temporada.

La sospecha de la enfermedad vino derivada por la detección de una muy baja mortalidad en una de las 5 naves de la granja (con un censo aproximado de 27.000 aves de 23 semanas de edad, las más jóvenes de la granja), considerada como unidad epidemiológica independiente, por lo que las medidas de erradicación se están aplicando exclusivamente en esta nave. Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de



la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la Enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus.

Los SVO de Valencia han adoptado inmediatamente las siguientes medidas, establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión:

- Inmovilización inmediata de la granja afectada desde la sospecha del foco.
- Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.
- Se está procediendo a realizar el vacío sanitario de la granja afectada y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.
- Establecimiento de una zona de restricción alrededor del foco. En la zona de 3 km no hay granjas comerciales, y en radio 3-10 km hay 21 granjas comerciales.

La granja se encontraba convenientemente vacunada frente a la enfermedad, habiendo sido aplicadas 4 dosis de vacuna en las aves, lo cual no ha logrado prevenir la introducción del virus en una de las naves. La vacunación del resto de las naves ha permitido que se mantengan libres de virus. El origen de la infección se encuentra actualmente en estudio.

Desde el MAPA se recomiendan las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

Toda la información relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/newcastle/Enf_newcastle.aspx

Para información sobre la enfermedad en aves silvestres, incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de aves silvestres sospechosas, se recomienda consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la Enfermedad de Newcastle: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF